

stronghold[®]  **PLUS**
selamectina/sarolaner



PROTECCIÓN
FRENTA A PULGAS
Y GARRAPATAS
SÓLIDA COMO
UNA ROCA

LOS ESTUDIOS LO DEMUESTRAN

Ya disponibles nuevas
presentaciones de 6 pipetas



zoetis



STRONGHOLD® PLUS protege al gato de un amplio espectro de parásitos incluyendo las **4 ESPECIES DE GARRAPATAS* MÁS PREVALENTES EN LA PENÍNSULA¹**



GARRAPATAS

Protección contra las 4 especies de garrapatas más prevalentes en la península²⁻³



STRONGHOLD® PLUS protege contra *I. ricinus* y *I. hexagonus* durante 5 semanas.



STRONGHOLD® PLUS protege contra *D. reticulatus* y *R. sanguineus* durante 4 semanas.



PULGAS

Acción de eliminación que persiste más allá del intervalo de tratamiento



Tras su administración, las pulgas adultas presentes en el gato mueren en 24 horas durante 5 semanas (el 70% antes de las primeras 12 horas)⁴.



ÁCAROS DEL OÍDO

Eficacia probada contra los ácaros de los oídos



99% de eficacia el día 30 contra *Otodectes cynotis*^{5,6} con una sola aplicación.



FILARIAS

Eficacia del 100%⁷ en la prevención de la filariosis, administrado mensualmente



Este medicamento veterinario no es eficaz frente a formas adultas de *D. immitis*. La administración a animales con filariosis no planteó problemas de seguridad.



GUSANOS GASTROINTESTINALES

Eficacia demostrada en el tratamiento de los nematodos gastrointestinales adultos



STRONGHOLD® PLUS es eficaz frente a Ascáridos (*Toxocara cati*).



STRONGHOLD® PLUS es eficaz frente a Anquilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*).




PIOJOS

Eficacia probada contra los piojos



STRONGHOLD® PLUS es eficaz contra piojos mordedores (*Felicola subrostratus*).



STRONGHOLD® PLUS TABLAS COMPARATIVAS



Velocidad de eliminación de Garrapatas*

Velocidad de eliminación	ENFERMEDAD	Tiempo estimado para transmisión
Frontline Combo® 48 h (<i>I. ricinus</i>)	<i>B. burgdorferi</i> (Lyme)	24-48h
Broadline® 48 h (<i>I. ricinus</i>)	<i>Anaplasma phagocytophilum</i>	36-48h
Bravecto® 48 h (<i>I. ricinus</i>)	<i>Babesia canis</i> (Piroplasmosis)	24-48h
stronghold® PLUS 24 h (<i>I. ricinus</i>)	<i>Ehrlichia canis</i>	3h (!) Tras la exposición

* Según SPC



Comparativa espectro**

		stronghold® PLUS selamectina/sarolaner	Bravecto®**	Broadline®***			
		Duración T°*	Espectro	Duración T°	Espectro	Duración T°	Espectro
PULGAS	<i>C. felis</i>	15 sem		12 sem		12 sem	
	<i>C. canis</i>	15 sem		-	No	-	No e
Garrapatas	<i>I. ricinus</i>	15 sem		12 sem		9 sem	
	<i>I. hexagonus</i>	15 sem		-	No	-	No
	<i>D. reticulatus</i>	12 sem		-	No	-	No
	<i>R. sanguineus</i>	12 sem		-	No	-	No
	<i>O. cynotis</i>	-		-	No	-	No
Gusanos Intestinales	<i>T. cati</i>	-		-	No	-	
	<i>A. tubaeforme</i>	-		-	No	-	
	<i>F. subrostratus</i>	-		-	No	-	No
Gusano del Corazón	<i>D. immitis</i>	12 sem		-	No	12 sem	

* Considerando una caja de 3 pipetas de Stronghold® Plus ** SPC Bravecto® ***SPC Broadline®

Frecuencia de *D. caninum*

Dipylidium es transmitido por pulgas y piojos masticadores: **STRONGHOLD® PLUS es altamente eficaz frente a pulgas y piojos**

Frecuencia de infestaciones por *D. caninum*: 0,1% a 1%*

Frecuencia Otocariosis: **17,4%***

Frecuencia pulgas: **15%***

* Beugnet F, Bourdeau P, Chalvet-Monfray K, Cozma V, Farkas R, Guillot J, Halos L, Joachim A, Losson B, Miro G, Otranto D, Renaud M, Rinaldi L. Parasites of domestic owned cats in Europe: co-infestations and risk factors. Parasit Vectors. 2014 Jun 25;7(1):291. doi:10.1186/1756-3305-7-291

STRONGHOLD® PLUS

TABLA POSOLÓGICA

Gatos	≤ 2,5 kg	> 2,5-5 kg	> 5-10 kg	> 10 kg
Pipeta (ml)	0.25	0.5	1	Combinación adecuada de pipetas
Selamectina (mg)	15	30	60	
Sarolaner (mg)	2,5	5	10	



Referencias: 1. Estrada-Peña, A., et al., Species of ticks and carried pathogens in owned dogs in Spain: Results of a one-year national survey. *Ticks Tick-borne Dis.* (2017), <http://dx.doi.org/10.1016/j.ttbdis.2017.02.00>. 2. Miro, G. Recomendaciones de ESCCAP para el control de las garrapatas en los animales de compañía. ARGOS [Internet]. 2014 [citado 8 Feb 2017]. Disponible en: <http://argos.portalveterinaria.com/noticia/9562/articulos-archivo/recomendaciones-de-escap-para-el-control-de-las-garrapatas-en-los-animales-de-compania.html>. 3. ECD (European Centre for disease prevention and Control) [Internet] Solna, Sweden. 2017 [citado 08 feb 2017]. Disponible en: <http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET-maps-tick-species.aspx>. 10. ESCCAP. Extoparásitos, control de insectos y garrapatas que parasitan a perros y gatos. Guía ESCCAP no3. Madrid. 2006. 14. Myers M, Vatta A, Rugg D, et al. Dose Confirmation of a Combination Product Containing PF-06450567 and Selamectin Against Infestations of *Otodectes cynotis* in Cats. Study Number A186C-US-14-110. *Data on file*. 4. Cherni JA, Rugg D, King VL. Speed of Kill of a Combination Product Containing PF-06450567 and Selamectin Against Induced Infestations of *Ctenocephalides felis* on Cats. Study Number A186C-US-14-130. *Data on file*. 5. Myers M, Vatta A, Rugg D, et al. Dose Confirmation of a Combination Product Containing PF-06450567 and Selamectin Against Infestations of *Otodectes cynotis* in Cats. Study Number A186C-US-14-110. *Data on file*. 6. Becskei C, Stegemann M, Lin D, et al. Dose Confirmation of PF-06450567 in Combination with Selamectin Administered Topically Against Infestations with *Otodectes cynotis* on Cats. Study Number A186C-ZA-14-126. *Data on file*. 7. von Reitzenstein M, Vatta A, King VL. Dose Confirmation of a Combination Product Containing PF-06450567 and Selamectin for Prophylaxis against *Dirofilaria immitis* in Cats. Study Number A186C-US-14-116. *Data on file*.

Stronghold® Plus 15 mg/2,5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos ≤ 2,5 kg; **Stronghold® Plus 30 mg/5 mg** solución para unción dorsal puntual para gatos > 2,5–5 kg; **Stronghold® Plus 60 mg/10 mg** solución para unción dorsal puntual para gatos > 5–10 kg. **Composición:** Cada pipeta contiene: Stronghold® Plus 15 mg/2,5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos ≤ 2,5 kg: 15 mg selamectina; 2,5 mg sarolaner; Stronghold® Plus 30 mg/5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos > 2,5–5 kg: 30 mg selamectina; 5 mg sarolaner; Stronghold® Plus 60 mg/10 mg solución para unción dorsal puntual para gatos > 5–10 kg: 60 mg selamectina; 10 mg sarolaner. **Indicaciones:** Para gatos con, o con riesgo de, infestaciones parasitarias mixtas por garrapatas y pulgas, piojos, ácaros, nematodos gastrointestinales o filarias. El medicamento veterinario está indicado exclusivamente cuando se indica al mismo tiempo el uso frente a garrapatas y uno o más de los otros parásitos diana. - Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.). El medicamento veterinario tiene actividad inmediata y persistente frente a nuevas infestaciones por pulgas durante 5 semanas. El producto mata a las pulgas adultas antes de poner huevos durante 5 semanas. A través de su acción ovidica y larvicida, el medicamento veterinario puede ayudar a controlar las infestaciones de pulgas ambientales existentes en áreas a las que el animal tiene acceso. - El producto puede ser utilizado como parte de una estrategia de tratamiento para la dermatitis alérgica de las pulgas (DAP). - Tratamiento de infestaciones por garrapatas. El medicamento veterinario tiene efecto acaricida inmediato y persistente durante 5 semanas frente a *Ixodes ricinus* e *Ixodes hexagonus*, y 4 semanas frente a *Dermacentor reticulatus* y *Rhipicephalus sanguineus*. - Tratamiento de los ácaros del oído (*Otodectes cynotis*). - Tratamiento de infestaciones de piojos mordedores (*Felicola subrostratus*). Las garrapatas deben adherirse al huésped y comenzar a alimentarse para exponerse al sarolaner. - Tratamiento de ascáridos adultos (*Toxocara cati*) y anquilostomas intestinales adultos (*Ancylostoma tubaeforme*). - Prevención de la filariosis causada por *Dirofilaria immitis* con administración mensual. **Contraindicaciones:** No utilizar en gatos que estén padeciendo una enfermedad concomitante, o que estén debilitados y con bajo peso (para su tamaño y edad). No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas, o a algún excipiente. **Precauciones:** El uso de este medicamento veterinario está indicado en gatos de al menos 8 semanas de edad y peso mínimo de 1,25 kg. Este medicamento veterinario debe aplicarse únicamente sobre la piel. No administrar por vía oral ni parenteral. No aplicar si el animal tiene el pelo húmedo. Para el tratamiento de las acariosis de los oídos, no aplicar directamente en el canal auricular. Es importante aplicar la dosis como se indica para prevenir que el animal pueda lamer o ingerir el producto. Si se produce una ingestión significativa, se pueden observar efectos en el tránsito intestinal como hipersalivación, emesis, heces blandas o consumo reducido de comida que deberían resolver normalmente sin tratamiento. Mantener a los animales tratados alejados del fuego u otras fuentes de ignición durante al menos 30 minutos o hasta que el pelo esté seco. El producto es dañino después de la ingestión. Mantenga el producto en el embalaje original hasta su uso, para evitar que los niños tengan acceso directo al producto. Las pipetas usadas deben ser desechadas inmediatamente. En caso de ingestión accidental, acídase inmediatamente al médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. El producto puede causar irritación en los ojos. Evitar el contacto con los ojos incluyendo el contacto de las manos con los ojos. Evitar el contacto directo con los animales tratados hasta que el área de aplicación esté seca. Lávese las manos después del uso y lave cualquier producto en contacto con la piel inmediatamente con agua y jabón. Si ocurre una exposición ocular accidental, enjuague los ojos inmediatamente con agua y busque atención médica. Los niños no deben jugar con los gatos tratados hasta 4 horas después del tratamiento. Se recomienda tratar a los animales por la noche. El día del tratamiento, no se debe permitir a los animales dormir en la misma cama que los dueños, especialmente con los niños. Las personas con piel sensible o hipersensibilidad conocida a este tipo de medicamentos deberán manipular el medicamento veterinario con precaución. Este producto es muy inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. **Conservación:** Conservar a temperatura inferior a 30 °C. No retire la pipeta del blister hasta que esté lista para usar. **Eliminación:** Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Stronghold® Plus no se deberá verter en cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para los organismos acuáticos. Los envases y residuos deberán eliminarse con los vertidos domésticos para evitar la contaminación de cursos de agua. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. N° registro:** EU/2/16/204/001-006. **Titular:** Zoetis Belgium SA.

stronghold® PLUS
selamectina/sarolaner

zoetis