

Avatec® 150 G

Coccidiostático. Lasalocid A de sodio (150 g/kg)

Aditivo para la incorporación al pienso de animales.

Distribuido por:

Zoetis Spain, S.L.
Avda. de Europa 20 B
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid)
España
Tel: +34 91 4191900
Nº α - Código de registro: α ESP19000050

Instrucciones de uso

Avatec® 150 G se utiliza como preventivo de la coccidiosis producida por *Eimeria* spp.
Para utilizarse sólo en las especies que se citan a continuación

Número de identificación del aditivo	Especies o categoría de animales	Lasalocid A de sodio mg/kg de pienso completo	Avatec® 150 G g/tonelada de pienso completo	Otras disposiciones
E 763	Pollos de engorde	75 - 125	500 - 830	Prohibida su administración al menos 5 días antes del sacrificio
	Pollitas de puesta hasta un máximo de 16 semanas de edad	75 - 125	500 - 830	
5 1 763	Pavos hasta un máximo de 16 semanas de edad	75 - 125	500 - 830	
	Faisanes, pintadas, codornices y perdices, excepto sus aves ponedoras.	75 - 125	500 - 830	

Lasalocid A de sodio: CAS Nº: 25999-20-6; EINECS Nº: 2474003

Indicaciones de peligro:

Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

Consejos de prudencia:

Prevenir la acumulación de polvo para reducir el riesgo de explosión.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas abiertas/de superficies calientes. No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para la extinción. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local/regional/nacional/internacional.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad.

Instrucciones de mezcla: Incorporar como una premezcla en el pienso compuesto. Limpiar minuciosamente todo el equipo de mezcla antes de preparar otros piensos/premezclas.

Condiciones de almacenamiento y estabilidad

Almacenar en lugar fresco (preferentemente por debajo de 25 °C) y seco, protegido de la luz, en el envase original cerrado. Cerrar bien la bolsa después de usarla. Avatec® 150 G puede almacenarse durante 36 meses en su bolsa original cerrada. Avatec® 150 G es estable hasta 12 semanas en piensos procesados almacenados en lugar seco y por debajo de 25 °C.

Advertencias y contraindicaciones

Peligroso para los équidos.

Este pienso contiene un ionóforo: su administración simultánea con determinados medicamentos puede estar contraindicada. Lasalocid A de sodio no debe mezclarse con otros coccidiostáticos.

zoetis

ES AHZ 677 1612