

SUMARIO DE CARACTERISTICAS

1. DENOMINACION COMERCIAL
BEDSA-VAC

2. NUMERO Y FECHA DE REGISTRO
171/8265 el 24 de Septiembre de 1976.

3. NOMBRE, DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION Y DEL FABRICANTE
LABORATORIOS SOBRINO, S.A.
Ctra. Camprodón, s/n "La Riba"
VALL DE BIANYA, Olot (Gerona)

4. COMPOSICION
Suspensión inactivada y purificada de **Salmonella abortus ovis** y **Chlamydia psittaci** (var. ovis y capra) con adyuvante oleoso.
2 ml de vacuna contienen como mínimo, $10^{7.5}$ DLE₅₀ de **Chlamydia psittaci** (var. ovis), $10^{7.5}$ DLE₅₀ de **Chlamydia psittaci** (var. capra) y 2×10^9 U.F.C. de **Salmonella abortus ovis**.

5. FORMA FARMACEUTICA
Emulsión inyectable.

6. CARACTERISTICAS DE LA VACUNA
Vacuna inactivada contra los abortos infecciosos producidos por **Chlamydia psittaci** y **Salmonella abortus ovis**. Contiene un adyuvante de la inmunidad de tipo oleoso para conseguir una protección elevada y persistente.

DILIGENCIA: ...

Para hacer constar que el nuevo titular de la autorización de comercialización del producto es **FORT DODGE VETERINARIA, S.A.**

Madrid, 18 de Marzo de 1999
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE SANIDAD ANIMAL


Fdo.: Ignacio Sánchez Esteban



BED2V-INC

BED2V-INC

BED2V-INC

BED2V-INC

OTRODO
COM VIGILANTE
SANTOMERTE
BED2VINC
RENOVIADO POR
CANTIDAD Y BOLSAS
CONTIENE ET. ARTIFICIO
DANVO ET. ARTIFICIO
DANVO

OTRODO
COM VIGILANTE
SANTOMERTE
BED2VINC
RENOVIADO POR
CANTIDAD Y BOLSAS
CONTIENE ET. ARTIFICIO
DANVO ET. ARTIFICIO
DANVO



COMERCIO EXTERNO

OTRODO


COMERCIO EXTERNO



COMERCIO EXTERNO



DILIGENCIA: ...



7. INDICACIONES

Prevención de los abortos producidos por bedsonias y salmonelas (aborto paratífico). Prevención de la neumonía de los corderos.

8. DOSIFICACION

Ovejas y cabras, 2 ml.
Corderos y cabritos, 1 ml.
Ganado vacuno, 5 ml.

9. VIA DE ADMINISTRACION

Subcutánea (pliegue costo-axilar o inguinal) o intramuscular.

10. PAUTA DE VACUNACION

La primovacunación debe hacerse a base de dos inoculaciones realizadas antes y después de la época de la cubrición. La revacunación anual se hace a base de una sola inoculación ya sea antes o después de la cubrición.

Para prevenir la neumonía de los corderos es suficiente una inoculación realizada a las 2 ó 3 semanas de edad.

11. PRECAUCIONES EN EL EMPLEO

Antes de proceder a la aplicación del producto debe agitarse enérgicamente el frasco, con objeto de conseguir una suspensión uniforme de los distintos componentes de la vacuna.

Al vacunar animales gestantes deben tomarse el máximo de precauciones en el empleo.

Usar ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción del contenido.

12. NOTAS IMPORTANTES

Es recomendable que los animales a vacunar estén en buenas condiciones higiénicas, libres de parásitos, de cualquier enfermedad y no sometidos a ningún tipo de stress con objeto de asegurar una buena respuesta inmunitaria.

Como cualquier producto biológico ocasionalmente pueden tener lugar reacciones de hipersensibilidad así como reacciones adversas (anorexia, postración e inflamación pasajera del punto de inoculación).

Los animales no podrán sacrificarse para consumo humano hasta transcurridos 21 días de la aplicación de la vacuna.

13. CONSERVACION

Consérvese a temperatura entre 4 y 7°C y al abrigo de la luz. Evítese cualquier riesgo de congelación.

14. PRESENTACION

Frascos de 20 ml y 250 ml. Envase de 2x50 ml.

15. ENVASE

- Frascos de vidrio blanco neutro (tipo I) de 20 ml de capacidad y vidrio blanco tratado (tipo II) de 50 ml y 250 ml de capacidad.
- Tapones de elástomero adecuados.
- Cápsulas de aluminio adecuadas.
- Etiqueta identificatoria.
- Prospecto.
- Estuche impreso.

