Coccidiostático

Cygro® 10G / Cygro® 1%

Maduramicina de amonio alfa (10 g/kg)

Aditivo para la incorporación al pienso de animales.
Instrucciones de uso: Cygro® se utiliza como preventivo de la coccidiosis producida por *Eimeria* spp. Para utilizarse solo en las especies que se citan a continuación.

Número de identificación	Especie o categoría de animales	Maduramicina de amonio alfa mg/kg de pienso completo	Cygro® g/tonelada de pienso completo	Otras disposiciones
5 1 770	Pollos de engorde	5 - 6	500 - 600	Prohibida su administración al menos 3 días antes del sacrificio
Maduramicina amonio alfa: CAS N° 84878-61-5				

ATENCION
Indicaciones de Peligro: Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de Prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Evitar respirar el polvo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/ médico si la persona se encuentra mal. Eliminar el contenido o recipiente de conformidad con la normativa local.
Información suplementaria sobre los peligros: Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.
Instrucciones de mezcla: Incorporar como una premezcla en el pienso compuesto. Limpiar minuciosamente todo el equipo de mezcla antes de preparar otros piensos/premezclas.
Condiciones de almacenamiento y estabilidad: Almacenar en lugar fresco (preferentemente por debajo de 25º C) y seco, protegido de la luz, en el envase original cerrado. Cerrar bien la bolsa después de usarla. Cygro® puede almacenarse durante 36 meses en su bolsa original cerrada. Cygro® es estable hasta 6 meses en premezclas y 4 meses en formulaciones de piensos completos cuando se almacena en lugar seco y por debajo de 25 ºC.
Advertencias y contraindicaciones: Peligroso para los équidos. Este pienso contiene un ionóforo: su administración simultánea con determinadas sustancias (por ejemplo, la tiamulina) puede estar contraindicada. Maduramicina de amonio alfa no debe mezclarse con otros coccidiostáticos. Seguridad: durante la manipulación deben utilizarse dispositivos de protección respiratoria, gafas y guantes.

Zoetis Belgium SA
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
BÉLGICA
αBE101766

Distribuido por:
Zoetis Spain, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
Edificio nº 1
c/ Quintanavides nº 13
28050 Madrid
España

Tel: +34 900 200 920
Nº α - Código de registro:
α ESP19000050

zoetis

KTN 1005 2005

Coccidiostat / Coccidiostático / Coccidiostatique / Coccidiostatico / Kokzidiostatikum

Cygro® 10G/Cygro® 1%

EN:

Contains Maduramicin ammonium alpha, 10g/kg. For animal nutrition only. To be fed only after mixing in compound feed. Dangerous for equine species. Store in a cool (preferably <25°C) dry area protected from light, in original, closed packaging. **Hazard Statement:** Harmful if inhaled. **Precautionary Statement:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Ground and bond container and receiving equipment. Avoid breathing dust. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Dispose of waste and residues in accordance with local authority requirements.

Supplemental hazard information:
May form combustible dust concentrations in air.

ES:

Contiene maduramicina de amonio alfa, 10 g/kg. Utilizarse sólo para alimentación animal. Administrar únicamente tras la incorporación en el pienso compuesto. Peligroso para los équidos. Almacenar en lugar fresco (preferentemente por debajo de 25° C) y seco, protegido de la luz, en el envase original cerrado. **Indicaciones de peligro:** Nocivo en caso de inhalación. **Consejos de prudencia:** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Evitar respirar el polvo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Eliminar el contenido o recipiente de conformidad con la normativa local.

Información suplementaria sobre los peligros:
Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

Zoetis Belgium SA
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
BELGIUM

EU Id. N° 5 1 770

CAS N° 84878-61-5

508975/40031451

αBE101766

WARNING
ATENCIÓN
ATTENTION
ATTENZIONE
WARNUNG

FR:

Contient Maduramicine ammonium alpha, 10 g/kg. Uniquement pour l'alimentation animale. Dangereux pour l'espèce équine. A administrer seulement après incorporation dans un aliment composé. Stocker dans un endroit sec et frais (de préférence <25°C), protégé de la lumière, dans l'emballage original fermé. **Danger :** Nocif par inhalation. **Précautions :** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Eviter de respirer la poussière. A n'utiliser qu'à l'extérieur ou dans une zone bien ventilée. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer les déchets et résidus conformément aux exigences locales. **Informations additionnelles sur les dangers :** Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air.

IT:

Contiene Maduramicina ammonio alfa, 10 g/kg. Riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali. Da somministrare solamente se incorporato in un mangime composto. Pericoloso per la specie equina. Conservare in un luogo fresco (preferibilmente ad una temperatura < 25 °C) ed asciutto, protetto dalla luce, nella confezione originale chiusa. **Indicazioni di pericolo:** Nocivo se inalato. **Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Evitare di respirare la polvere. Utilizzare soltanto all'aperto o in un luogo ben ventilato. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. Smaltire i rifiuti e i residui in conformità ai requisiti delle Autorità locali.
Informazioni supplementari sui pericoli: Può formare concentrazioni di polvere combustibile nell'aria.

DE:

Enthält Maduramicin-Ammonium-Alpha, 10 g/kg. Nur für die Tierernährung. Gefährlich für Equiden. Nur nach Einmischen in Mischfutter zu verfüttern. Lagerung lichtgeschützt, trocken und kühl (vorzugsweise <25°C), in der ungeöffneten Originalverpackung. **Gefahrenhinweis:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweise:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Einatmen von Staub vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI EINATMEN: Person an die frische Luft bringen und in einer die Atmung erleichternden Lage halten. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Abfälle und Rückstände entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Ergänzende Gefahreninformation:
Kann in der Luft brennbare Staubkonzentrationen erzeugen.

Net weight
Peso neto
Poids net
Peso netto
Nettogewicht

20 kg

Product code
Código de producto
Numéro de produit
Codice del prodotto
Warennummer

10007032

Lot number
Número de lote
Numéro de lot
Numero di lotto
Chargen-Bezeichnung

XXXXXXX

Manufacturing date
Fecha de fabricación
Date de fabrication
Data di produzione
Herstellungsdatum

15/05/19

Expiry date
Fecha de caducidad
A utiliser avant fin
Data di scadenza
Mindestens haltbar bis Ende

30/04/22

(01) 0 5414736 03197 2(11) 170300(17) 200200(10) XXXXXXX

zoetis