

Tabla de dosis



APOQUEL[®] indicaciones:

- Tratamiento del prurito asociado con dermatitis alérgica en perros
- Tratamiento de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros

APOQUEL[®] dosis y pauta de tratamiento:

- La **dosis inicial de APOQUEL[®]** es de 0.4 a 0.6 mg/kg, en **administración oral**, dos veces al día hasta 14 días.
- Para **terapia de mantenimiento**, la misma dosis de 0.4 a 0.6 mg/kg, **debe administrarse una vez al día**.
- Los comprimidos de APOQUEL[®] pueden administrarse **con o sin comida**.
- La duración del tratamiento con APOQUEL[®] se debe adaptar de acuerdo a **la enfermedad subyacente y la severidad del picor**.

Peso del perro	Presentación y nº de tabletas que deben administrarse		
	APOQUEL [®] 3.6 mg comprimidos	APOQUEL [®] 5.4 mg comprimidos	APOQUEL [®] 16 mg comprimidos
3.0 - 4.4	1/2		
4.5 - 5.9		1/2	
6.0 - 8.9	1		
9.0 - 13.4		1	
13.5 - 19.9			1/2
20.0 - 26.9		2	
27.0 - 39.9			1
40.0 - 54.9			1 1/2
55.0 - 80.0			2